

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网,若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



碳酸钙加工过程,碳酸钙化验室的基础

阿特拉津(农药杀虫剂)月桂酸隔苯甲酸安息香酸杀菌丹草酸钠醋酸纤维素有机颜料等大豆蛋白胶凝淀粉酒糟小麦糖小麦淀粉等。氢氧化钠标准滴定溶液浓度按下式计算： $m \times C_{NaOH} = \dots \dots \dots V \times$ 试中：C NaOH--氢氧化钠标准滴定溶液的浓度，mol/L--苯二甲酸氢钾的质量，g；--苯二甲酸氢钾的摩尔质量，g/mol；mol/L苯甲酸无水乙醇标准溶液的配制将苯甲酸置于硅胶干燥器中干燥4h后，称取.3g溶于L无水乙醇中， 贮存在带胶塞的装有硅胶干燥管玻璃瓶内。

准确称取 - 克氧化钙（将高纯试剂碳酸钙在-下灼烧至恒量），置于mL干燥的锥形瓶中，加入mL甘油无水乙醇溶液装上回流冷凝器， 在有石棉网的电炉上加热煮沸，至溶液呈深红色后取下锥形瓶，立以mol/L苯甲酸无水乙醇标准溶液滴定至微红色消失。苯甲酸无水乙醇标准滴定溶液对氧化钙的滴定度按下式计算： $m \times T_{CaO} = \dots \dots \dots V$ 式中，TCaO--每毫升苯甲酸无水乙醇标准滴定溶液相当于氧化钙的毫克数。

EDTA标准滴定溶液C(EDTA) = mol/L称取约g EDTA置于烧杯中，加约mL水，加热溶解过滤，用水稀释至L。吸取mL碳酸钙标准溶液（见后）于mL烧杯中，加水稀释至约mL 加入适量的CMP混合指示剂，在搅拌下加入氢氧化钾溶液至出现绿色荧光后再过量 - mL,以EDTA标准滴定溶液滴定至绿色荧光消失并呈现红色。硫酸铜标准滴定溶

液C(CuSO₄)=0.0mol/L将g硫酸铜溶于水中，加-滴硫酸(+)，用水稀释至L摇匀。EDTA标准滴定溶液与硫酸铜标准滴定体积比的测定从滴定管缓慢放出 - ml (V) 0.0mol/L EDTA标准滴定溶液于mL烧杯中，用水稀释至约mL，加mL乙酸-乙酸钠缓冲溶液(PH)，加热至沸，取下稍冷，加-滴PAN指示剂。EDTA标准滴定溶液与硫酸铜标准滴定溶液的的体积比按下式计算： $V_K = \frac{V}{V_K}$ 每毫升硫酸铜标准滴定溶液相当于EDTA标准滴定溶液的毫升数。

V---EDTA标准滴定溶液的体积，mLV---滴定时消耗硫酸铜标准滴定溶液的体积；氢氧化钠标准滴定溶液C(NaOH)=0.5mol/L将0g氢氧化钠溶于0L水中，充分摇匀，贮存于带胶塞(装有钠石灰干燥管)的硬质玻璃或塑料瓶内。标定：称取g苯二钾酸氢钾，置于mL烧杯中，加入约mL新煮沸过的已用氢氧化钠溶液中和至酚酞呈微红色的冷水，搅拌使其溶解。红旗水泥厂化验室，为了测定某矿山石灰石中碳酸钙的质量分数，取石灰石样品与足量稀盐酸在烧杯中反应(假设石灰石样品中杂质不与稀盐酸反应也不溶于水。根据质量守恒定律，二氧化碳的质量为：60g+g-67.6g=g解：设该石灰石样品中碳酸钙的质量为xCaCO₃+HCl==CaCl₂+H₂O+CO₂↑0044xg此石灰石中碳酸钙的质量分数为：马上分享给同学据魔方格专家权威分析，试题“红旗水泥厂化验室，为了测定某矿山石灰石中碳酸钙的质量分数，取”主要考查你对化学反应方程式的计算等考点的理解。考点名称：化学反应方程式的计算利用化学方程式的简单计算：理论依据：所有化学反应均遵循质量守恒定律，根据化学方程式计算的理论依据是质量守恒定律。例如镁燃烧的化学反应式为Mg+OMgO，其中各物质的质量之比为，m(Mg)m(O)n(MgO)=48380=35。有关化学方程式的计算：含杂质的计算，在实际生产和实验中绝对纯净的物质是不存在的，因此解题时把不纯的反应物换算成纯净物后才能进行化学方程式的计算，而计算出的纯净物也要换算成实际生产和实验中的不纯物。气体密度(g/L)=纯度=×00%=×00%=-杂质的质量分数纯净物的质量=混合物的质量×纯度综合计算：.综合计算题的常见类型将溶液的相关计算与化学方程式的相关计算结合在一起的综合计算。

碳酸钙加工

将图像图表表格实验探究与化学方程式相结合的综合计算.综合计算题的解题过程一般如下综合型计算题是初中化学计算题中的重点难点。这种题类型复杂，知识点多，阅读信息量大，思维过程复杂，要求学生有较高的分析应用能力和较强的文字表达能力。碳酸钙加工过程,碳酸钙化验室的基础考查的不仅是有关化学式化学方程式溶解度溶质质量分数的有关知识，也是考察基本概念原理及元素化合物的有关知识。综合计算相对对准确度较大，但只要较好地掌握基本类型的计算，再加以认真审题，理清头绪，把握关系，步步相扣，就能将问题顺利解决。

·溶质质量分数与化学方程式相结合的综合计算溶质质量分数与化学方程式相结合的综合计算题，问题情景比较复杂。解题时，应首先明确溶液中的溶质是什么，溶质的质量可通过化学方程式计算得出，其次应明确所求溶液的质量如何计算，最后运用公式计算出溶液的溶质质量分数。解题的关键是掌握生成溶液质量的计算方法：生成溶液的质量=反应前各物质的质量总和-难溶性杂质(反应的混有的且不参加反应的)的质量-生成物中非溶液(生成的沉淀或气体)的质量。固体与液体反应后有关溶质质量分数的计算于固体与液体发生反应，求反应后溶液中溶质的质量分数，首先要明确生成溶液中的溶质是什么，其次再通过化学反应计算溶质质量是多少(有时溶质质量由几个部分组成)，最后分析各量间的关系，求出溶液总质量，再运用公式计算出反应后溶液中溶质的质量分数。

对于反应所得溶液的质量有两种求法： 溶液组合法：溶液质量=溶质质量+溶剂质量，其中溶质一定是溶解的，溶剂水根据不同的题目通常有两种情况：原溶液中的水；化学反应生成的水。 质量守恒法：溶液质量=进入液体的固体质量(包括由于反应进入和直接溶入的)+液体质量-生成不溶物的质量-生成气体的质量。

此类计算与固体和液体反应后的计算类似，首先应明确生成溶液中的溶质是什么，其次再通过化学应计算溶质质量是多少(往往溶质质量由几个部分组成)，最后分析各量间的关系求出溶液总质量再运用公式计算出反应后溶液中溶质的质量分数此类反应发生后，溶液质量也有两种求法： 溶液组合法(同上)。图像表格实验探究与化学方程式相结合的综合计算在近几年中考题出现了以图像，表格为载体的化学计算题这类题的特点是利用数学方法将化学实验数据进行处理和表达，常常以坐标曲线图像表格等形式将解题信息呈现。解答此类题目时，要求学生能够对图像，表格进行科学分析从中获取有用信息并结合化学知识将有用信息，应用到实际问题中图像与化学方程式结合的综合计算图像型计算题是常见的题型是坐标曲线题，其特点是借助数学方法中的坐标图，把多个元素对体系变化的影响用曲线图直观表示出来。

坐标系中的曲线图不仅能表示化学反应，碳酸钙加工过程,碳酸钙化验室的基础还能较好地反映化学变化的过程，读图时，要善于从曲线图中捕捉到“三点”，(起点，拐点，终点)，并分析其含义。

表格与化学方程式结合的综合计算这类题往往给出一组或多组数据或条件，通过对表格中数据或条件的分析，对比，解答有关问题或进行计算。

策略：要通过仔细阅读，探究表格中各组数据之间内在的规律，努力从“变”中找“不变”，及时发现规律之中的矛盾点，从“不变”中找“变”，进而分析矛盾的根源，解决问题。实验探究与化学方程式相结合的综合计算做实验探究的综合计算题时，学生应将化学计算与化学实验紧密结合，在对实验原理，实验数据进行分析理解的基础上，理出解题思路，在解题过程中要特别注意实验数据与物质(或元素)质量间的关系，解题的关

键是理清思路，找出正确有用数据，认真做好每一步计算。

解析：甲组同学的实验中被氢氧化钠溶液吸收的是CO₂碳酸钙加工过程,碳酸钙化验室的基础还原FeO生成的CO，由gCO的质量作为已知条件，根据方程式可计算出FeO的质量乙组同学的实验中0g样品被CO充分碳酸钙加工过程,碳酸钙化验室的基础还原后剩余g固体，减少的质量为FeO中氧元素的质量，利用产生的差量可求出FeO的质量。

关系式法抓住已知量与未知量之间的内在关系，建立关系式，化繁为简，减少计算误差，是化学计算常用方法之一。

相对分子质量平均值法由化合物组成的混合物，要判断混合物中各物质是否存在或计算某成分的质量，可用相对分子质量平均值法解题。解题时根据化学方程式和其他方法求出平均相对分子质量，混合物中一种物质的相对分子质量如果大于平均相对分子质量，则另一种物质的相对分子质量必小于平均相对分子质量，据此可求出正确答案。

守恒法化学变化中等量关系的简历，有一条很重要的定律——质量守恒定律，参加化学反应的各物质的质量总和等于反应后生成的各物质的质量总和。在实际应用中，上述定律演绎为：a化学反应前后，物质发生变化生成新物质，但组成物质的元素种类不变，质量不变；b化学反应前后，分子本身发生变化，而分子的数目虽然有的改变，但原子的种类，数目不变。下面分类进行讨论：质量守恒法 发宁前后反应物与生成物质量守恒 溶液混合或稀释前后，溶质总质量守恒 化学反应中某些元素的质量守恒电荷守恒法溶液中阴阳离子个数不一定相等，但正负电荷总数相等。

a题目中给出化学反应前后某两种物质的等量关系（已知条件），求混合物中各组分间的质量比—找等量设为假设置量。比较法解题时对题目给定的已知条件或数据，结合有关知识进行全面，仔细地分析，比较，然后确定正确答案。运用该法解题时有如下情况：分类比较：按被选择对象的某些特点，先分类后比较选择计算比较：解题时先做简单计算，然后比较化学式，相对分子质量或分子中某一相同原子的个数，最后选择。例：铅蓄电池中需要一定质量分数的硫酸溶液，现将%的硫酸溶液（密度为dg/ml）与0%的硫酸溶液（密度为dg/ml）按体积比混合，已知dd，所得溶液的质量分数A大于%B等于%C等于%D小于%解析：当两种同溶质的溶液混合时，以mga%的溶液和mgb%的溶液混合为例，且ab。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/yVauTanSuanPwCtD.html>