

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



尿激酶生产厂家,尿激酶生产技术厂家

尿激酶专用壳聚糖产品描述：普通壳聚糖与尿激酶专用壳聚糖相比，尿激酶专用壳聚糖比普通壳聚糖吸附蛋白更多。我公司生产的尿激酶专用壳聚糖利用尿激酶的作用底物在结构上与壳聚糖相似，在适当的条件下选择性地吸附分离和纯化尿激酶。其主要特点是针对尿激酶分子结构而生产最适合的比表面与孔结构以及活性的柱层析产品，在达到分离提纯目的同时提高产品质量和收率。性状注射用尿激酶为白色或类白色无定形粉末，由分子量分别为和两部分物质组成，溶于水，每毫克酶蛋白的尿激酶活性应不低于国际单位。包括急性广泛性肺栓塞胸痛—小时内的冠状动脉栓塞和心肌梗死症状短于一小时的急性期脑血管栓塞视网膜动脉栓塞和其他外周动脉栓塞症状严重的髂-股静脉血栓形成者。

规格注射用尿激酶为灭菌冻干制剂，每安瓿含国际单位的尿激酶活性，毫克甘露醇、0毫克人白蛋白和毫克氯化钠。

肺栓塞初次剂量单位/公斤体重，以生理盐水或%葡萄糖溶液配制，以毫升/小时速度在分钟内滴完；其后以每小时单位的给药速度，连续静脉滴注小时或1小时。肺栓塞时，也可按每公斤体重单位生理盐水配制后肺动脉内注入；必要时，可根据情况调整剂量，间隔小时重复一次，最多使用三次。心肌梗死建议以生理盐水配制后

,按单位/分速度冠状动脉内连续滴注小时,滴注前应先行静脉给予肝素500-单位。

禁忌下列情况的病人禁用本品：急性内脏出血急性颅内出血，陈旧性脑梗死近两月内进行过颅内或脊髓内外科手术颅内肿瘤动静脉畸形或动脉瘤出血素质严重难控制的高血压患者。相对禁忌症包括延长的心肺复苏术严重高血压近周内的外伤3周内手术或组织穿刺妊娠分娩后天活跃性溃疡病。注意事项应用本品前，应对病人进行红细胞压积血小板记数凝血酶时间（TT）凝血酶原时间（PT）激活的部分凝血致活酶时间（APTT）测定。

一旦出现出血症应立停药，按出血情况和血液丧失情况补充新鲜全血，纤维蛋白原血浆水平 < mg/dl伴出血倾向者应补充新鲜冷冻血浆或冷沉淀物，不宜用右旋糖苷羟乙基淀粉。药理毒理本品直接作用于内源性纤维蛋白溶解系统，能催化裂解纤溶酶原成纤溶酶，后者不仅能降解纤维蛋白凝块，亦能降解血循环中的纤维蛋白原凝血因子 和凝血因子 等，从而发挥溶栓作用。但是，鉴于本品增加纤溶酶活性，降低血循环中的未结合型纤溶酶原和与纤维蛋白结合的纤溶酶原，可能出现严重的出血危险。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/xkhBNiaoJiHMS8n.html>